

东阳市人民医院一院区

明尼苏达多相个性测查表(MMPI-399)测评报告

个人信息

姓名: 任淳佳 性别: 女 年龄: 17
婚姻状况: 未婚 文化程度: 高中 从事行业:
门诊号: d23917578 科室: 精神科 医生: 杜彦莉

测试结果

原始分: 164 用时: 29:49
标准分: 164 用时预警: 正常
重项预警: 正常

各量表得分明细

维度	疑问(Q)	说谎(L)	诈病(F)	防御(K)	疑病(Hs)	抑郁(D)	癔症(Hy)	精神病性(Pd)	女子气(Mff)	妄想狂(Pa)	精神衰弱(Pt)	精神分裂(Sc)	轻躁狂(Ma)	社会内向(Si)	疑病(Hs+0.5K)	精神病性(Pd+0.4K)	精神衰弱(Pt+1K)	精神分裂(Sc+1K)	轻躁狂(Ma+0.2K)
原始分	27.0	4.0	6.0	13.0	10.0	26.0	26.0	19.0	42.0	13.0	16.0	18.0	17.0	21.0	10.0	19.0	16.0	18.0	17.0
标准分	62.99	43.59	38.29	53.31	51.13	46.07	57.0	51.32	75.29	50.27	44.99	43.56	49.02	26.26	54.13	53.32	50.99	49.56	50.02

诊断说明

疑问(Q): 测验结果可信。

说谎(L): 正常。表明他们在承认和否认一些轻微的不受社会赞许的言行方面处于适当水平, 受试者可能试图给人以良好印象的头脑比较复杂的人。

诈病(F): 低分。受试者系统性地回避认同该量表上对大多数(90%以上)正常人来说不能接受的条目, 或他们没有受到这些条目的影响; 或极力否认患有严重的精神疾病; 或是一个十分谦卑、依赖、诚实、单纯和平静的正常人。

防御(K): 正常。表明受试者来源于较低的社会经济阶层, 或受教育程度有限。但受试者在暴露自身的问题和自我保护方面较适当, 没有明显的心理不协调表现。

疑病(Hs): 正常。表明受试者认同一些有关躯体不适主诉的条目, 如轻度情绪抑郁, 衰弱, 但无明显功能障碍或者没有因此受到影响。

抑郁(D): 正常。表明受试者回答了一些反映其存在症状性抑郁的体验和行为相关的条目。

癔症(Hy): 升高。表明受试者的性格特征是好表现, 外向, 肤浅, 幼稚, 自我中心, 否认任何问题。他们愿意看到生活中乐观的一面, 避免不愉快的事情。

精神病性(Pd): 正常。表明受试者认同了一些对权威疏远和不感兴趣条目。

女子气(Mff): 明显升高。精神疾病患者中高分的男性, 被认为是被动的, 社会敏感, 可接近, 有广泛的审美观和社会兴趣, 并且性格内向, 依赖, 把自己的男性角色看得不安全, 通常倾向于认同女性角色, 经常报告有抑郁, 焦虑, 紧张, 罪过感。如男

性是同性恋者或有同性恋关注，并且是愿意公开承认这些行为或关注的话，他们将在量表5上得很高的分数。\$50-36

妄想狂(Pa)：正常。表明受试者可能比较敏感和多疑，因而能够避免回答一些意义明显的条目。他们热心，成熟，情绪稳定，有自知之明，有自制力，善于应对环境，爽快，合群。

精神衰弱(Pt)：正常。表明受试者可以处理工作和个人责任，而没有过分的担忧和焦虑。

精神分裂(Sc)：正常。表明以阴性症状为主的精神分裂症或慢性精神分裂症患者可能得分在此范围;如非患者，在此范围内的分数是正常的。

轻躁狂(Ma)：正常。

社会内向(Si)：极度低分。表明受试者情绪反复无常，与他人相处时关系很浮浅，缺乏真正的亲密性。如果受试者同时在量表3和量表4中T分升高，那么这些特点就更可能存在。

检查医生： _____

审核医生： _____

日期： 2024-09-17 _____

(本报告结果仅供参考，如需明确自身情况，具体情况请以医生诊断为准。)