

# 东阳市人民医院一院区

## 明尼苏达多相个性测查表(MMPI-399)测评报告

### 个人信息

姓名：卢金明 性别：男 年龄：44  
婚姻状况：已婚 文化程度：初中 从事行业：  
门诊号：d02031428 科室：精神科 医生：刘之旺

### 测试结果

原始分：149 用时：49:42  
标准分：149 用时预警：正常  
重项预警：正常

#### 各量表得分明细

| 维度  | 疑问(Q) | 说谎(L) | 诈病(F) | 防御(K) | 疑病(Hs) | 抑郁(D) | 癔症(Hy) | 精神病性(Pd) | 男子气(Mfm) | 妄想狂(Pa) | 精神衰弱(Pt) | 精神分裂(Sc) | 轻躁狂(Ma) | 社会内向(Si) | 疑病(Hs+0.5K) | 精神病性(Pd+0.4K) | 精神衰弱(Pt+1K) | 精神分裂(Sc+1K) | 轻躁狂(Ma+0.2K) |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 原始分 | 46.0  | 8.0   | 11.0  | 8.0   | 20.0   | 26.0  | 32.0   | 10.0     | 26.0     | 13.0    | 27.0     | 19.0     | 10.0    | 33.0     | 20.0        | 10.0          | 27.0        | 19.0        | 10.0         |
| 标准分 | 80.89 | 58.56 | 47.69 | 39.54 | 72.15  | 48.98 | 67.18  | 29.8     | 46.34    | 51.02   | 62.84    | 49.09    | 37.77   | 48.3     | 78.15       | 33.8          | 73.84       | 60.09       | 39.77        |

### 诊断说明

**疑问(Q)**：测验结果可信。

**说谎(L)**：显著升高。受试者可能有以下几种情况：（1）可见于那些过度自我控制能力，而对自身行为缺乏洞察力的正常人；（2）具有强烈的宗教信仰和/或从事道德教育的职业人员往往否认这些条目中提到的在一般人群中常见的轻微的“不良言行”；（3）在人才选拔或寻求职业的人中,为了给人一种不寻常的良好印象的人；强烈否认存在精神障碍或心理问题的受试者（常见于表演性人格障碍或躯体化障碍时）或虽然所有量表没有升高而实际上患严重精神病,无自知力的住院精神病患者；（5）没有足够的阅读能力（智力偏低、居住在偏远山庄的社会经济地位较低的或只受过小学教育的人）；

**诈病(F)**：正常。多数正常人在这个范围，受试者有时会有一些不寻常的体验。

**防御(K)**：低分。（1）表明受试者在涉及心理问题时，承认个人心理资源有限，需进一步调查清楚，受试者是否确实存在他所回答的某些心理问题或精神病理表现；（2）表明受试者特别喜欢倾诉自己的不幸和夸大精神疾病，有的是纯粹的“诈病”者（如司法鉴定中的当事人）。

**疑病(Hs)**：明显升高。表明受试者过分关心躯体健康，陈述有模糊不清的症状或不适，悲观失望，不悦人格不成熟，利己，自我中心，敌意，迟钝，缺乏热情，长期处于低效率状态，牢骚满腹，要求别人同情和注意，受试者把注意力集中在不明确的躯体症候上，拒绝任何形式的解脱，心理或躯体干预预后不好。

**抑郁(D)**：正常。表明受试者回答了一些反映其存在症状性抑郁的体验和行为相关的条目。

**癔症(Hy)**：明显升高。（1）人格特征是，自我中心，不成熟和幼稚。受试者要求受人注意.操纵人际关系，往往在人际关系中

不加抑制和好出风头。尽管受试者与其他人相处时，在表面上和不成熟水平上是相对的，但如同时发现量表0(Si)上的T分为30左右时，这种表面性和处理人际关系上缺乏真诚性和亲密性的特征，就会变得十分明显；（2）受试者对他人不敏感和缺乏同情心反映着其自我中心。受试者的原始心理防卫机制在于否认和退化作用，通常显示否认和过度控制。往往情绪不成熟和不稳定，极其害怕疼痛，情绪性和躯体性痛苦均可导致该量表上得高分。当处于应激时，高分很可能显示有躯体不适体验，如头痛，胸痛或心悸。此时，受试者还显示短暂的情绪抑郁和焦虑。尽管其症状学变化在应激期很可能会戏剧性地随时发生转换，但量表Hy上的高分很少是精神病性的；（3）这种人往往因为某些强烈的需要而力图给人以良好印象，寻求注意和同情，因而显示愿意与临床医生合作。然而，受试者通常不能忍受对其人格特征进行动力学分析，常无休止地提出一些不合理要求。从受试者的个人历史看，这些特征通常是根深蒂固的，受试者对此缺乏自知之明。当医生指出其实际情况时，受试者往往不能认识自己的患者角色，而埋怨医生不理解他们。这样，尽管受试者最初给人以良好的印象，但采取任何形式的心理干预却未必都能得到预期的效果。

**精神病性(Pd)：**低分。表明受试者往往过分顺从，刻板，墨守成规，传统，缺乏果断兴趣范围狭窄，缺乏创见。对自身感到不满，对他人的反应很敏感，愿意接受他人的意见，但表现无主见，优柔寡断，容易相信他人，往往满足于平庸和单调的生活。男性可能缺乏与异性的兴趣，特别是当该量表分数很低时。

**男子气(Mfm)：**正常。表明受试者对传统的男性兴趣有兴趣。

**妄想狂(Pa)：**正常。表明受试者可能比较敏感和多疑，因而能够避免回答一些意义明显的条目。他们热心，成熟，情绪稳定，有自知之明，有自制力，善于应对环境，爽快，合群。

**精神衰弱(Pt)：**明显升高。（1）受试者焦虑，紧张，拿不定主意，可能会产生激动不安，思想难以集中、内疚、孤独、苛求、完美主义、内向、紧张、过分担忧、缺乏安全感。处事优柔寡断、缺乏果敢、苦闷、循规蹈矩、缺乏创见。性情怪僻、难接近、人际关系不良。常常有自主神经功能亢进如多汗、心悸等)症状经常闷闷不乐，有强迫思维和强迫行为。这时，他们自己和他人通常能看出其过度焦虑。在分数极高的情况下，通常有激动不安，过度思虑及烦扰，他们不再能控制其焦虑，并且可能产生对自己无能的愧疚感或消极观念。在进行其他形式的治疗性咨询前，对焦虑进行精神药物治疗很有必要。（2）正常人通常用正面术语来描述。虽然一些人(尤其是妇女)，在某种程度上显示神经质特征高分男性则被描述为重情感、负责任、谨慎、言词斯文、正统、不情感用事、理想主义。然而，高分女性却被描述为，过分担忧、爱情感用事、高度紧张、通常对自身情况明显的不满。

**精神分裂(Sc)：**正常。表明以阴性症状为主的精神分裂症或慢性精神分裂症患者可能得分在此范围;如非患者，在此范围内的分数是正常的。

**轻躁狂(Ma)：**极度低分。表明受试者缺乏活动，心情不悦，通常有明显情绪抑郁。不管其在量表2的得分如何，当量表9在此范围内时应考虑存在严重抑郁的可能。

**社会内向(Si)：**正常。表明受试者报告其在社交上外向性和内向性态度和行为处于平衡状态。

检查医生： \_\_\_\_\_

审核医生： \_\_\_\_\_

日期： 2024-09-07

(本报告结果仅供参考，如需明确自身情况，具体情况请以医生诊断为准。)