

东阳市人民医院一院区

明尼苏达多相个性测查表(MMPI-399)测评报告

个人信息

姓名: 吴幼萱 性别: 女 年龄: 16
婚姻状况: 未婚 文化程度: 高中 从事行业:
门诊号: gj4214770 科室: 精神科 医生: 刘之旺

测试结果

原始分: 196 用时: 19:10
标准分: 196 用时预警: 答题时间过短
重项预警: 正常

各量表得分明细

| 维度 | 疑问(Q) | 说谎(L) | 诈病(F) | 防御(K) | 疑病(Hs) | 抑郁(D) | 癔症(Hy) | 精神病性(Pd) | 女子气(Mff) | 妄想狂(Pa) | 精神衰弱(Pt) | 精神分裂(Sc) | 轻躁狂(Ma) | 社会内向(Si) | 疑病(Hs+0.5K) | 精神病性(Pd+0.4K) | 精神衰弱(Pt+1K) | 精神分裂(Sc+1K) | 轻躁狂(Ma+0.2K) |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 原始分 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | 5.0 | 17.0 | 40.0 | 23.0 | 22.0 | 31.0 | 21.0 | 40.0 | 45.0 | 25.0 | 59.0 | 17.0 | 22.0 | 40.0 | 45.0 | 25.0 |
| 标准分 | 42.04 | 39.56 | 66.12 | 33.56 | 65.99 | 73.58 | 51.47 | 58.28 | 47.99 | 70.17 | 76.57 | 72.72 | 65.08 | 80.94 | 75.99 | 66.28 | 96.57 | 92.72 | 69.08 |

诊断说明

疑问(Q): 测验结果可信。

说谎(L): 正常。表明他们在承认和否认一些轻微的不受社会赞许的言行方面处于适当水平, 受试者可能试图给人以良好印象的头脑比较复杂的人。

诈病(F): 极度升高。这样水平的剖面图绝大多数无效。(1) 少数严重的住院精神患者;(2) 处于心理危机状态(包括伪装精神疾病);(3) 完全答“是”时也会过多地认同条目;(4) 对条目全答“是”时。

防御(K): 低分。(1) 表明受试者在涉及心理问题时, 承认个人心理资源有限, 需进一步调查清楚, 受试者是否确实存在他所回答的某些心理问题或精神病理表现;(2) 表明受试者特别喜欢倾诉自己的不幸和夸大精神疾病, 有的是纯粹的“诈病”者(如司法鉴定中的当事人)。

疑病(Hs): 明显升高。表明受试者过分关心躯体健康, 陈述有模糊不清的症状或不适, 悲观失望, 不悦人格不成熟, 利己, 自我中心, 敌意, 迟钝, 缺乏热情, 长期处于低效率状态, 牢骚满腹, 要求别人同情和注意, 受试者把注意力集中在不明确的躯体症状上, 拒绝任何形式的解脱, 心理或躯体干预后不好。

抑郁(D): 明显高分。表明受试者存在情绪抑郁, 焦虑, 心境不佳和情绪压抑体验对自己的躯体不适和功能水平低下(如感到虚弱, 疲乏无力, 没有活力等)感到过分敏感, 紧张, 通常有行为退缩和感到被社会遗弃。就其程度而言, 量表2的分数和这些负性感受代表着对自身状态的不满意程度是一致的。高分者还经常有躯体症状和不适体验, 睡眠障碍, 缺乏食欲。当然, 这些患者还存在持久地活动过少, 心情不愉快等情况。量表D高分者, 往往性格内向, 害羞, 退缩, 不善人际交往。而且, 学业和事业都不满意。

癡症(Hy): 正常。表明受试者回答了一定数目的反映歇斯底里性人格动力学相关的态度和行为的条目。

精神病性(Pd): 升高。表明受试者关心社会问题及所发生的某些事件, 他们可能对这些冲突作出反应, 或者已适应了这种人际冲突和社会冲突将其习以为常。如果这种冲突是情境性的, 事后就会回到正常水平。

女子气(Mff): 正常。表明受试者对传统的男性兴趣有兴趣。

妄想狂(Pa): 明显升高。表明受试者可能多疑, 有敌意, 过度敏感, 通常有多种迫害性妄想, 或夸大性妄想或观念, 感受到受人歧视, 易怒, 愤恨不平, 将自己的失败归于他人, 对人敌意, 报复, 可能有明显的思维混乱。

精神衰弱(Pt): 明显升高。(1) 受试者焦虑, 紧张, 拿不定主意, 可能会产生激动不安, 思想难以集中、内疚、孤独、苛求、完美主义、内向、紧张、过分担忧、缺乏安全感。处事优柔寡断、缺乏果敢、苦闷、循规蹈矩、缺乏创见。性情怪僻、难接近、人际关系不良。常常有自主神经功能亢进如多汗、心悸等)症状经常闷闷不乐, 有强迫思维和强迫行为。这时, 他们自己和他人通常能看出其过度焦虑。在分数极高的情况下, 通常有激动不安, 过度思虑及烦扰, 他们不再能控制其焦虑, 并且可能产生对自己无能的愧疚感或消极观念。在进行其他形式的治疗性咨询前, 对焦虑进行精神药物治疗很有必要。(2) 正常人通常用正面术语来描述。虽然一些人(尤其是妇女), 在某种程度上显示神经质特征高分男性则被描述为重情感、负责任、谨慎、言词斯文、正统、不情感用事、理想主义。然而, 高分女性却被描述为, 过分担忧、爱情感用事、高度紧张、通常对自身情况明显的不满。

轻躁狂(Ma): 表明受试者行为冲动, 好竞争, 健谈, 自恋, 缺乏道德观念, 外向, 社会人际关系浮浅。他们的典型表现是不能控制其行为, 敌意, 易激惹。在临床上, 这种人没有情绪抑郁, 可能表现出典型的躁狂特征: 思维奔逸, 情绪易变, 夸大妄想, 行为冲动, 活动过度。

社会内向(Si): 极度升高。表明受试者存在社会性不适, 与现实社会隔离, 退缩, 自我非难, 与他人交往中表现明显的焦虑不安。

26/62:

受试者可能为偏执倾向。

28/82:

受试者可能为精神病患者。多主诉焦虑、神经过敏、紧张易激动、睡眠不稳定、精力不集中、思想混乱、健忘等症状。

68/86:

受试者常易被诊断为精神分裂症。这种人表现多疑, 不信任、缺乏自信与自我评价。对日常生活表现退缩, 情感平淡, 思想混乱, 并有偏执妄想, 不能与别人保持密切关系, 常与现实脱节。

78/87:

受试者常有高度激动与烦躁不安等症状。缺乏掌握环境压力的能力, 可能有防御系统衰弱表现。

检查医生: _____

审核医生: _____

日期: 2024-10-05

(本报告结果仅供参考, 如需明确自身情况, 具体情况请以医生诊断为准。)