

# 东阳市人民医院

# 明尼苏达多相个性测查表(MMPI-399)测评报告

## 个人信息

姓 名：柴飞扬

性 别：男

年 龄： 22

婚姻状况：未婚

文化程度：大学

从事行业：

门诊号: 12491402

科 室：精神科

医 生：刘之旺

## 测试结果

原始分：183

用时: 32:54

标准分：183

用时预警：正常

重项预警：正常

各量表得分明细																			
维度	疑问 (Q)	说谎 (L)	诈病 (F)	防御 (K)	疑病 (Hs)	抑郁 (D)	癔症 (Hy)	精神病性 (Pd)	男子气 (Mfm)	妄想狂 (Pa)	精神衰弱 (Pt)	精神分裂 (Sc)	轻躁狂 (Ma)	社会内向 (Si)	疑病 (Hs+0.5K)	精神病性 (Pd+0.4K)	精神衰弱 (Pt+1K)	精神分裂 (Sc+1K)	轻躁狂 (Ma+0.2K)
原始分	26.0	1.0	17.0	5.0	19.0	36.0	29.0	22.0	27.0	18.0	40.0	47.0	26.0	41.0	19.0	22.0	40.0	47.0	26.0
标准分	62.26	32.34	58.15	33.36	74.79	70.34	64.88	56.64	48.09	62.77	76.73	75.32	62.93	58.57	83.79	63.64	93.73	92.32	65.93

## 诊断说明

疑问(Q): 测验结果可信。

**说谎(L):**低分。这种情况多见于所有条目认同为“是”，受试者试图制造一种极端病理的外观。有些则相对有主观或充满自信的正常人，但是他们却不愿意承认该量表提示的哪些轻微的、不受社会赞许的言行或人们共有的“弱点”。

**诈病(F):** 明显升高。这种剖图很可能无效，应该检查其他效度量表分数证实。 (1) 见于随机回答，处于严重的应激状态，脑损伤，或患有精神疾病（特别是精神分裂症）的患者； (2) 夸大精神疾病倾向的人（如涉及损伤精神赔偿等）； (3) 有少数问题青少年可能也认同该量表上的条目，应该检查所认同条目的内容以确定是否反映的是他们的真实情况； (4) 有的受试者因为没有相应的阅读能力。

**防御(K):** 低分。 (1) 表明受试者在涉及心理问题时, 承认个人心理资源有限, 需进一步调查清楚, 受试者是否确实存在他所回答的某些心理问题或精神病理表现; (2) 表明受试者特别喜欢倾诉自己的不幸和夸大精神疾病, 有的是纯粹的“诈病”者(如司法鉴定中的当事人)。

**疑病(Hs):** 明显升高。表明受试者过分关心躯体健康，陈述有模糊不清的症状或不适，悲观失望，不悦人格不成熟，利己，自我中心，敌意，迟钝，缺乏热情，长期处于低效率状态，牢骚满腹，要求别人同情和注意，受试者把注意力集中在不明确的躯体症候上，拒绝任何形式的解脱，心理或躯体干预后不好。

**抑郁(D):** 明显高分。表明受试者存在情绪抑郁，焦虑，心境不佳和情绪压抑体验对自己的躯体不适和功能水平低下(如感到虚弱，疲乏无力，没有活力等)感到过分敏感，紧张，通常有行为退缩和感到被社会遗弃。就其程度而言，量表2的分数和这些负性感受代表着对自身状态的不满程度是一致的。高分者还经常有躯体症状和不适体验，睡眠障碍，缺乏食欲。当然，这些患者还

存在持久地活动过少，心情不愉快等情况。量表D高分者，往往性格内向，害羞，退缩，不善人际交往。而且，学业和事业都不满意。

**癔症(Hy):** 明显升高。 (1) 人格特征是，自我中心，不成熟和幼稚。受试者要求受人注意.操纵人际关系，往往在人际关系中不加抑制和好出风头。尽管受试者与其他人相处时，在表面上和不成熟水平上是相对的，但如同时发现量表0(Si)上的T分为30左右时，这种表面性和处理人际关系上缺乏真诚性和亲密性的特征，就会变得十分明显； (2) 受试者对他人不敏感和缺乏同情心反映着其自我中心。受试者的原始心理防卫机制在于否认和退化作用，通常显示否认和过度控制。往往情绪不成熟和不稳定，极其害怕疼痛，情绪性和躯体性痛苦均可导致该量表上得高分数。当处于应激时，高分很可能显示有躯体不适体验，如头痛，胸痛或心悸。此时，受试者还显示短暂的情绪抑郁和焦虑。尽管其症状学变化在应激期很可能会戏剧性地随时发生转换，但量表Hy上的高分数很少是精神病性的； (3) 这种人往往因为某些强烈的需要而力图给人以良好印像，寻求注意和同情，因而显示愿意与临床医生合作。然而，受试者通常不能忍受对其人格特征进行动力学分析，常无休止地提出一些不合理要求。从受试者的个人历史看，这些特征通常是根深蒂固的，受试者对此缺乏自知之明。当医生指出其实际情况时，受试者往往不能认识自己的患者角色，而埋怨医生不理解他们。这样，尽管受试者最初给人以良好的印像，但采取任何形式的心理干预却未必都能得到预期的效果。

**精神病性(Pd):** 升高。表明受试者关心社会问题及所发生的某些事件，他们可能对这些冲突作出反应，或者已适应了这种人际冲突和社会冲突将其习以为常。如果这种冲突是情境性的，事后就会回到正常水平。

**男子气(Mfm):** 正常。表明受试者对传统的男性兴趣有兴趣。

**妄想狂(Pa):** 明显升高。表明受试者可能多疑，有敌意，过度敏感，通常有多种迫害性妄想，或夸大性妄想或观念，感到受人歧视，易怒，愤恨不平，将自己的失败归于他人，对人敌意，报复，可能有明显的思维混乱。

**精神衰弱(Pt):** 明显升高。 (1) 受试者焦虑，紧张，拿不定主意，可能会产生激动不安，思想难以集中、内疚、孤独、苛求、完美主义、内向、紧张、过分担忧、缺乏安全感。处事优柔寡断、缺乏果敢、苦闷、循规蹈矩、缺乏创见。性情怪僻、难接近、人际关系不良。常常有自主神经功能亢进如多汗、心悸等)症状经常闷闷不乐，有强迫思维和强迫行为。这时，他们自己和他人通常能看出其过度焦虑。在分数极高的情况下，通常有激动不安，过度思虑及烦扰，他们不再能控制其焦虑，并且可能产生对自己无能的愧疚感或消极观念。在进行其他形式的治疗性咨询前，对焦虑进行精神药物治疗很有必要。 (2) 正常人通常用正面术语来描述。虽然一些人(尤其是妇女)，在某种程度上显示神经质特征高分男性则被描述为重情感、负责任、谨慎、言词斯文、正统、不情感用事、理想主义。然而，高分女性却被描述为，过分担忧、爱情情感用事、高度紧张、通常对自身情况明显的不满。

**精神分裂(Sc):** 极度升高。受试者正处于急性应激状态。由于严重的情境性应激，广泛的焦虑不安，不能表达情感，在测验中可能认同很多意义明显的条目，或者出现错误的认同条目。这种情况在司法精神病学鉴定中很多见，解释时要注意。达到这样高度的分数，说明受试者正经历某种心理危机或重大事件，而通常不是精神分裂症患者。

**轻躁狂(Ma):** 正常。表明受试者友好，能适应社会，充满活力，健谈，热情。一般来说他们具有愉快的心情，开朗的性格。

**社会内向(Si):** 正常。表明受试者报告其在社交上外向性和内向性态度和行为处于平衡状态。

**12/21:**

受试者常有躯体的不适并伴有抑郁情绪。并长时间处于紧张状态，而且神经质。

**18/81:**

受试者可能为精神分裂症。

**28/82:**

受试者可能为精神病患者。多主诉焦虑、神经过敏、紧张易激动、睡眠不稳定、精力不集中、思想混乱、健忘等症状。

**78/87:**

受试者常有高度激动与烦躁不安等症状。缺乏掌握环境压力的能力，可能有防御系统衰弱表现。

检查医生：\_\_\_\_\_

审核医生：\_\_\_\_\_

日期： 2025-07-05

(本报告结果仅供参考，如需明确自身情况，具体情况请以医生诊断为准。)