

东阳市人民医院一院区

明尼苏达多相个性测查表(MMPI-399)测评报告

个人信息

姓名: 潘健航 性别: 男 年龄: 22
婚姻状况: 未婚 文化程度: 大学 从事行业:
门诊号: BJ0147697 科室: 精神科 医生: 金婉君

测试结果

原始分: 157 用时: 39:50
标准分: 157 用时预警: 正常
重项预警: 正常

各量表得分明细

维度	疑问(Q)	说谎(L)	诈病(F)	防御(K)	疑病(Hs)	抑郁(D)	癔症(Hy)	精神病性(Pd)	男子气(Mfm)	妄想狂(Pa)	精神衰弱(Pt)	精神分裂(Sc)	轻躁狂(Ma)	社会内向(Si)	疑病(Hs+0.5K)	精神病性(Pd+0.4K)	精神衰弱(Pt+1K)	精神分裂(Sc+1K)	轻躁狂(Ma+0.2K)
原始分	18.0	5.0	11.0	15.0	4.0	35.0	19.0	22.0	23.0	8.0	19.0	15.0	9.0	45.0	4.0	22.0	19.0	15.0	9.0
标准分	55.2	48.73	46.96	56.19	39.91	68.35	45.04	56.64	38.68	37.33	49.64	40.35	28.8	64.13	45.91	60.64	60.6	51.35	30.8

诊断说明

疑问(Q): 测验结果可信。

说谎(L): 正常。表明他们在承认和否认一些轻微的不受社会赞许的言行方面处于适当水平, 受试者可能试图给人以良好印象的头脑比较复杂的人。

诈病(F): 正常。多数正常人在这个范围, 受试者有时会有一些不寻常的体验。

防御(K): 轻度升高。表明受试者具有良好的自我调节能力, 有较好的洞察力, 有主见, 能较容易地处理日常问题。受过高等教育的人或较高社会地位的人士的分数, 往往在此范围。即便处于应激状态, 受试者也可能不愿意寻求帮助以解决其所遇到的问题。

疑病(Hs): 正常。表明受试者认同一些有关躯体不适主诉的条目, 如轻度情绪抑郁, 衰弱, 但无明显功能障碍或者没有因此受到影响。

抑郁(D): 明显高分。表明受试者存在情绪抑郁, 焦虑, 心境不佳和情绪压抑体验对自己的躯体不适和功能水平低下(如感到虚弱, 疲乏无力, 没有活力等)感到过分敏感, 紧张, 通常有行为退缩和感到被社会遗弃。就其程度而言, 量表2的分数和这些负性感受代表着对自身状态的不满意程度是一致的。高分者还经常有躯体症状和不适体验, 睡眠障碍, 缺乏食欲。当然, 这些患者还存在持久地活动过少, 心情不愉快等情况。量表D高分者, 往往性格内向, 害羞, 退缩, 不善人际交往。而且, 学业和事业都不满意。

癔症(Hy): 正常。表明受试者回答了一定数目的反映歇斯底里性人格动力学相关的态度和行为的条目。

精神病性(Pd): 升高。表明受试者关心社会问题及所发生的某些事件, 他们可能对这些冲突作出反应, 或者已适应了这种人

际冲突和社会冲突将其习以为常。如果这种冲突是情境性的，事后就会回到正常水平。

男子气(Mfm)：正常。表明受试者对传统的男性兴趣有兴趣。

妄想狂(Pa)：正常。表明受试者可能比较敏感和多疑，因而能够避免回答一些意义明显的条目。他们热心，成熟，情绪稳定，有自知之明，有自制力，善于应对环境，爽快，合群。

精神衰弱(Pt)：正常。表明受试者可以处理工作和个人责任，而没有过分的担忧和焦虑。

精神分裂(Sc)：正常。表明以阴性症状为主的精神分裂症或慢性精神分裂症患者可能得分在此范围;如非患者，在此范围内的分数是正常的。

轻躁狂(Ma)：极度低分。表明受试者缺乏活动，心情不悦，通常有明显情绪抑郁。不管其在量表2的得分如何，当量表9在此范围内时应考虑存在严重抑郁的可能。

社会内向(Si)：升高。表明受试者在社会生活方面表现内向，害羞和孤独。

检查医生： _____

审核医生： _____

日期： 2023-10-14 _____

(本报告结果仅供参考，如需明确自身情况，具体情况请以医生诊断为准。)