

东阳市人民医院

明尼苏达多相个性测查表(MMPI-399)测评报告

个人信息

姓名：王可馨 性别：女 年龄：38
婚姻状况：未婚 文化程度：大学 从事行业：
门诊号：12824153 科室：精神科 医生：周子璇

测试结果

原始分：143 用时：
标准分：143 用时预警：答题时间过长
重项预警：正常

各量表得分明细

维度	疑问(Q)	说谎(L)	诈病(F)	防御(K)	疑病(Hs)	抑郁(D)	癔症(Hy)	精神病性(Pd)	女子气(Mff)	妄想狂(Pa)	精神衰弱(Pt)	精神分裂(Sc)	轻躁狂(Ma)	社会内向(Si)	疑病(Hs+0.5K)	精神病性(Pd+0.4K)	精神衰弱(Pt+1K)	精神分裂(Sc+1K)	轻躁狂(Ma+0.2K)
原始分	9.0	2.0	7.0	18.0	2.0	21.0	20.0	20.0	41.0	14.0	10.0	16.0	16.0	25.0	2.0	20.0	10.0	16.0	16.0
标准分	51.82	34.1	42.04	60.83	33.0	34.13	42.35	54.18	71.45	54.55	41.79	46.35	53.4	33.16	37.0	57.18	48.79	53.35	54.4

诊断说明

疑问(Q)：测验结果可信。

说谎(L)：低分。这种情况多见于所有条目认同为“是”，受试者试图制造一种极端病理的外观。有些则相对有主见或充满自信的正常人，但是他们却不愿意承认该量表提示的哪些轻微的、不受社会赞许的言行或人们共有的“弱点”。

诈病(F)：正常。多数正常人在这个范围，受试者有时会有一些不寻常的体验。

防御(K)：轻度升高。表明受试者具有良好的自我调节能力，有较好的洞察力，有主见，能较容易地处理日常问题。受过高等教育的人或较高社会地位的人士的分数，往往在此范围。即便处于应激状态，受试者也可能不愿意寻求帮助以解决其所遇到的问题。

疑病(Hs)：低分。表明受试者否认存在不清的躯体疾病。表现乐观，自信，敏锐，处事有能力。

抑郁(D)：低分。表明受试者往往性格外向，合群，乐观，自信，敏锐，进取，聪明，精力充沛，灵活，活泼。但应注意，需确认行为和该受试者社会地位和所处情境的合适性，受试者一般很少得此范围内的分数，分数过低者往往有行为不能自控，冲动，好夸耀，好出风头，对权威不满。

癔症(Hy)：正常。表明受试者回答了一定数目的反映歇斯底里性人格动力学相关的态度和行为的条目。

精神病性(Pd)：正常。表明受试者认同了一些对权威疏远和不感兴趣条目。

女子气(Mff)：明显升高。精神疾病患者中高分的男性，被认为是被动的，社会敏感，可接近，有广泛的审美观和社会兴趣，并且性格内向，依赖，把自己的男性角色看得不安全，通常倾向于认同女性角色，经常报告有抑郁，焦虑，紧张，罪过感。

如男性是同性恋者或有同性恋关注，并且是愿意公开承认这些行为或关注的话，他们将在量表5上得很高的分数。\$0-36

妄想狂(Pa)：正常。表明受试者可能比较敏感和多疑，因而能够避免回答一些意义明显的条目。他们热心，成熟，情绪稳定，有自知之明，有自制力，善于应对环境，爽快，合群。

精神衰弱(Pt)：正常。表明受试者可以处理工作和个人责任，而没有过分的担忧和焦虑。

精神分裂(Sc)：正常。表明以阴性症状为主的精神分裂症或慢性精神分裂症患者可能得分在此范围;如非患者，在此范围内的分数是正常的。

轻躁狂(Ma)：正常。

社会内向(Si)：极度低分。表明受试者情绪反复无常，与他人相处时关系很浮浅，缺乏真正的亲密性。如果受试者同时在量表3和量表4中T分升高，那么这些特点就更可能存在。

检查医生： _____ **审核医生：** _____ **日期：** 2025-06-30 _____

(本报告结果仅供参考，如需明确自身情况，具体情况请以医生诊断为准。)